

Solution

**I.-1.a)** Pour un cycle d'ordre  $n$ , il existe donc un cycle pour  $f$  nul,  $a_1, \dots, a_n$ , tel que  $(a_1, \dots, a_n)$  engendre  $E$ .

Notons que \*  $\forall i \in \mathbb{N}$   $f^{k_i}(a_i) = a_{i+k_i}$   
 \*  $\forall i \in \{2, n\}$   $a_i \neq a_1$

Si  $a_i = a_j$  avec  $\{i, j \in \mathbb{N}_n\}$ , on aura  $f^{n+1-i}(a_i) = f^{n+1-j}(a_j)$   
 $\{i < j\}$   
 ce qui entraîne  $a_1 = a_{j-i+1}$  où  $1 \leq j-i+1 \leq n+1-i = n$ .  
 Par hypothèse :  $i = j - i + 1 \Rightarrow i = j$ .

**I.-1.b)** Comme  $E$  est de dimension 2, il suffit de montrer que 2 vecteurs consécutifs forment un système libre.

Par l'absurde si  $a_1$  et  $a_{n+1}$  sont colinéaires, il existe  $\lambda \in \mathbb{R}$  tel que  $a_{n+1} = \lambda a_1$  (puisque  $a_1 \neq 0$ . En effet,  $a_1 \neq 0 \Rightarrow a_1 \neq f(a_1) \Rightarrow a_1, a_2, \dots$  sont distincts d'après I.-1.a). Par récurrence, on aurait :

$$a_{i+1} = \lambda^i a_1 \quad \forall i \text{ variant de } 1 \text{ à } n+1$$

et le système  $(a_1, \dots, a_n)$  serait lâ. Absurde.

**I.2**

\*  $\forall i \in \mathbb{N}$ ,  $f^n(a_i) = a_{i+n} = a_i$

$f^n(a_i) = a_i$  pour tout vecteur du système génératrices  $(a_1, \dots, a_n)$  de  $E$ , donc  $f^n = \text{Id}$ .

\* Si on vérifie  $a_m \in E$  et  $f^m = \text{Id}$ , on aura  $f^m(a_i) = a_{m+i} = a_i$  avec  $1 \leq m \leq n$  ce qui est contredit à l'hypothèse.

\* On doit montrer que  $\forall i \in \mathbb{N}$  :

|  $(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a))$  cycle pour  $f \Leftrightarrow a$  n'est pas un vecteur propre de  $f$ .

( $\Rightarrow$ ) Si  $(a, f(a), \dots, f^{n-1}(a))$  est un cycle pour  $f$ ,  $(a, f(a))$  est un système libre d'après I.-1.b, donc  $a$  n'est pas un vecteur propre de  $f$ .

$\Leftarrow$  Si  $\alpha$  n'est pas un vecteur propre de  $f$ , le système  $(\alpha, f(\alpha))$  est libre (car  $\alpha \neq 0$ ). Montrons que  $(\alpha, f(\alpha), \dots, f^{n-1}(\alpha))$  est un cycle pour  $f$ :

1)  $(\alpha, f(\alpha))$  donc à fortiori  $(\alpha, f(\alpha), \dots, f^{n-1}(\alpha))$  engendre le plan  $E$

$$2) f(f^i(\alpha)) = f^{i+1}(\alpha)$$

$$3) \forall i \in [2, n-1] \quad f^i(\alpha) \neq \alpha$$

Sinon  $f^i(\alpha) = \alpha$  et  $f^i(f(\alpha)) = f(f^i(\alpha)) = f(\alpha)$ .

$(\alpha, f(\alpha))$  étant une base de  $E$ , on en déduit  $f^i = \text{Id}$  avec  $2 \leq i \leq n-1$ , en contradiction avec  $n = \dim \{d \in \mathbb{N}^* / f^d = \text{Id}\}$ .

CQFD

**I.3** Soit  $a_1, \dots, a_n$  un cycle pour  $f$ .

Notons  $a_1 = \alpha$  et  $a_2 = f(\alpha)$ . ( $\alpha \neq \text{vect. propre de } f$ )

$(\alpha, f(\alpha))$  est une base de  $E$  (I.1.b) et la matrice de  $f$  dans cette base est

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}$$

\*  $f^n = \text{Id}$  entraîne  $(\det A)^n = 1 \Leftrightarrow (-a)^n = 1 \Rightarrow a \in \{\pm 1\}$

\*  $a = -\det f$  et  $b = \text{tr } f = \text{trace de } f$  sont entièrement déterminés par  $f$ .

\* On calcule:

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & b \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & ab \\ b & a+b^2 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}$$

ie 
$$f^2 = a \text{Id} + b f$$

NB: On peut aussi calculer le polynôme caractéristique de  $A$  et appliquer le Th. de Cayley-Hamilton.

**I.4**

D.I

$I = \{P \in \mathbb{R}[X] / P(f) = 0\}$  est un idéal de  $\mathbb{R}[X]$  car :

- C'est un sous-groupe :

$$0 \in I \text{ car si } P, Q \in I \quad (P-Q)(f) = P(f) - Q(f) = 0 \text{ montre que } P-Q \in I.$$

- $\forall Q \in \mathbb{R}[X] \quad \forall P \in I \quad QP(f) = Q(f) \cdot P(f) = 0 \Rightarrow QP \in I$

$I$  est l'idéal annulateur de  $f$ .  $\mathbb{R}[X]$  étant un anneau principal,  $I$  sera principal. On note  $m_f(x)$  le polynôme unitaire qui engendre  $I$ . C'est le polynôme minimal de  $f$ .

$$f^2 - bf - a = 0 \text{ entraîne } m_f(x) \mid X^2 - bx - a \quad (*)$$

Si  $\deg m_f = 1$ , alors  $m_f(x) = x - \lambda \Rightarrow f = \lambda \text{Id}$  ce qui est absurde car  $(a, f(a))$  est libre. Donc  $\deg m_f = 2$  et  $(*)$  entraîne :

$$m_f(x) = X^2 - bx - a$$

$f^n = \text{Id}$  entraîne  $m_f(x) \mid X^n - 1$  et montre que  $X^n - 1$  ayant  $n$  racines simples dans  $\mathbb{C}$ ,  $m_f(x) = X^2 - bx - a$  n'a que des racines simples dans  $\mathbb{C}$ .

NB : Ainsi  $b^2 + 4a \neq 0$

$$\begin{pmatrix} \frac{b}{2} & 1 \\ 1 & \frac{b}{2} \end{pmatrix}$$

**I.5**

Si  $f^2 = \text{Id}$ ,  $m_f(x) \mid X^2 - 1$  et  $m_f$  étant unitaire de degré 2, on aura

$$m_f(x) = X^2 - 1 = X^2 - bx - a \doteq P(x)$$

$P(x) = (x-1)(x+1)$  aura ses racines réelles

Réiproquement, si les racines de  $P(x)$  sont réelles (et distinctes d'après I.4),  $P(x) = m_f(x)$  divise  $X^n - 1$  qui possède au plus 2 racines réelles ± 1, on aura :

$$P(x) = (x-1)(x+1) = X^2 - 1$$

d'où  $P(f) = 0 = f^2 - \text{Id}$

$f^2 = \text{Id}$ .

CQFD

I.6

\* On cherche une forme bil. symétrique  $\Xi$  telle que

$$\begin{cases} \Xi(a_1, a_1) = 1 \\ \Xi(f(x), f(y)) = \Xi(x, y) \quad \forall x, y \end{cases} \quad (*)$$

$$\text{Soit } \Delta = b^2 + 4ac < 0 \Rightarrow a = -1 \text{ et } |b| < 2$$

Travaillons dans la base  $(a_1, a_2) = (a_1, f(a_1))$  du I.3.

$$\begin{cases} x = x_1 a_1 + x_2 a_2 \\ y = y_1 a_1 + y_2 a_2 \end{cases}$$

$$\Xi(x, y) = x_1 y_1 \underbrace{\Xi(a_1, a_1)}_{=1} + x_2 y_2 \underbrace{\Xi(a_2, a_2)}_{=1} + \Xi(a_1, a_2)(x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

\* Déterminons  $\Xi(a_1, a_2)$ :

$$\text{Comme } f(a_2) = a_1 a_2 + b a_2,$$

$$\Xi(a_1, a_2) = \Xi(f(a_1), f(a_2)) = \Xi(a_2, a_1 a_2 + b a_2) = a \underbrace{\Xi(a_1, a_2)}_{=1} + b \underbrace{\Xi(a_2, a_2)}_{=1}$$

$$\text{donc } \boxed{\Xi(a_1, a_2) = \frac{b}{2}}$$

\* Réciproquement, vérifions que la forme bil. sym.  $\Xi$  dont la matrice dans la base  $(a_1, a_2)$  est

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

vérifie (\*).

$$\Xi(x, y) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \frac{b}{2} x_1 y_2 + \frac{b}{2} x_2 y_1$$

$$\text{Gra: } \begin{cases} f(x) = x_1 a_2 + x_2 f(a_2) = x_1 a_2 + x_2 (a_1 a_2 + b a_2) = -x_2 a_1 + (x_1 + b x_2) a_2 \\ f(y) = -y_2 a_1 + (y_1 + b y_2) a_2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{donc } \Xi(f(x), f(y)) &= x_2 y_2 + (x_1 + b x_2)(y_1 + b y_2) + \frac{b}{2} (-x_2(y_1 + b y_2) - y_2(x_1 + b x_2)) \\ &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + \frac{b}{2} x_1 y_2 + \frac{b}{2} x_2 y_1 \\ &= \Xi(x, y) \end{aligned}$$

et, bien sûr,  $\Xi(a_1, a_1) = 1$ .

<u>Solution:</u> $\Xi$ et $E \times E \xrightarrow{\Psi} \mathbb{R}$	$(x, y) \mapsto \Xi(f(x), f(y))$	coïncideront car elles coïncident sur la base $(a_1, a_2)$ . En effet:
$\Psi(a_1, a_2) \doteq \Xi(f(a_1), f(a_2)) = \Xi(a_1, a_2)$ d'après l'aller (ou un calcul direct)		
$\Psi(a_1, a_1) \doteq \Xi(f(a_1), f(a_1)) = \Xi(a_2, a_2) = -1 = \Xi(a_1, a_1)$		
$\Psi(a_2, a_2) \doteq \Xi(f(a_2), f(a_2)) = \Xi(\frac{a_1+ba_2}{2}, -a_1+ba_2) = \Xi(a_1, a_2) + b^2 \Xi(a_2, a_2)$		
		$-b \Xi(a_2, a_1) - b \Xi(a_1, a_2) = 1$

\*  $\Xi$  est un produit scalaire

C'est une f.b.o. non dégénérée car  $\begin{vmatrix} 1 & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & 1 \end{vmatrix} = 1 - \frac{b^2}{4} \neq 0$  (car  $|b| < 2$ )

et positive car  $\begin{vmatrix} 1-x & \frac{b}{2} \\ \frac{b}{2} & 1-x \end{vmatrix} = (1-x)^2 - \frac{b^2}{4} = x^2 - 2x + 1 - \frac{b^2}{4} \geq 0$

$\Delta' = 1 - (1 - \frac{b^2}{4}) = \frac{b^2}{4} > 0$  montre que les racines de ce polynôme, i.e. les invariants de  $\Xi$ , sont  $1 \pm \frac{|b|}{2}$ , toutes les 2 positives car  $|b| < 2$ .

2<sup>e</sup> solution : La signature de  $\Xi$  est aussi accessible en écrivant  $\Xi(n,n)$  comme somme de carrés par la méthode de Gauss.

Posons  $q(n) = \Xi(n, n) = x_1^2 + x_2^2 + b x_1 x_2$

$$q(n) = \left(x_1 + \frac{bx_2}{2}\right)^2 + \underbrace{\left(1 - \frac{b^2}{4}\right)x_2^2}_{>1} \text{ montre que } \Xi \text{ est définie positive.}$$

I.7 Nous sommes sous les hypothèses de I.6, donc  $a = -1$  et  $|b| < 2$ .

On avait  $\Xi(a_1, a_2) = \frac{b}{2}$ , de sorte que  $|\Xi(a_1, a_2)| < 1$ .

Il existe donc  $\theta \in [0, \pi]$  tel que  $\Xi(a_1, a_2) = \cos \theta$ .

\* Montrons que  $\Xi(a_k, a_1) = \cos((k-1)\theta)$  par récurrence sur  $k \in \mathbb{N}^*$ .

C'est vrai pour  $k=1$  :  $\Xi(a_1, a_1) = 1 = \cos 0\theta$ .

pour  $k=2$  :  $\Xi(a_2, a_1) = \cos \theta$

Supposons la propriété vraie jusqu'au rang  $k-1$ , où  $k \geq 2$  et cherchons  $\Xi(a_k, a_1)$  :

$$a_k = f^2(a_{k-2}) = (-\text{Id} + 2 \cos \theta \cdot f)(a_{k-2})$$

$$= -a_{k-2} + 2 \cos \theta \cdot a_{k-1}$$

$$\text{donc } \Xi(a_k, a_1) = -\Xi(a_{k-2}, a_1) + 2 \cos \theta \cdot \Xi(a_{k-1}, a_1)$$

$$= -\cos((k-3)\theta) + 2 \cos \theta \cdot \underbrace{\cos((k-2)\theta)}_{\frac{1}{2}(\cos((k-1)\theta) + \cos((k-3)\theta)} = \cos((k-1)\theta) \text{ oui!}$$

$$\ast \forall k, l \in \mathbb{N} \quad \overline{\Phi}(a_k, a_l) = \cos(k-l)\theta ?$$

On peut supposer  $k \geq l$  quitte à écrire  $\overline{\Phi}(a_k, a_l) = \overline{\Phi}(a_l, a_k)$

$$\overline{\Phi}(a_k, a_l) = \overline{\Phi}(f^{k-1}(a_1), f^{l-1}(a_1)) = \overline{\Phi}(f^{k-l}(a_1), a_1) = \overline{\Phi}(a_{k-l+1}, a_1) = \cos(k-l)\theta$$

$$\ast \text{ Posons } a_k = x a_1 + y a_2.$$

$$\begin{cases} \overline{\Phi}(a_k, a_1) = \cos(k-1)\theta \\ \overline{\Phi}(a_k, a_2) = \cos(k-2)\theta \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + y \cos\theta = \cos(k-1)\theta \\ x \cos\theta + y = \cos(k-2)\theta \end{cases}$$

Le déterminant est  $D = 1 - \cos^2\theta = \sin^2\theta \neq 0$  (car  $\theta \in ]0, \pi[$ ). Le système est de Cramer et admet la solution:

$$\left\{ \begin{array}{l} x = \frac{1}{\sin^2\theta} \begin{vmatrix} \cos(k-1)\theta & \cos\theta \\ \cos(k-2)\theta & 1 \end{vmatrix} = \frac{\cos((k-2)\theta + \theta)}{\sin^2\theta} \\ y = \frac{1}{\sin^2\theta} \begin{vmatrix} 1 & \cos(k-1)\theta \\ \cos\theta & \cos(k-2)\theta \end{vmatrix} = \frac{\cos((k-1)\theta - \theta)}{\sin^2\theta} \\ \end{array} \right. \quad \begin{aligned} &= \frac{-\sin\theta \cdot \sin(k-2)\theta}{\sin^2\theta} = -\frac{\sin(k-2)\theta}{\sin\theta} \\ &= \frac{\sin\theta \cdot \sin(k-1)\theta}{\sin^2\theta} = \frac{\sin(k-1)\theta}{\sin\theta} \end{aligned}$$

Ccl:

$$a_k = -\frac{\sin(k-2)\theta}{\sin\theta} a_1 + \frac{\sin(k-1)\theta}{\sin\theta} a_2$$

\* Soit  $h \in \mathbb{N}^*$ .  $f^2 = -\text{Id} + 2\cos\theta \cdot f$  montre l'existence de  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$  tels que  $f^h = \alpha \text{Id} + \beta f$ .

$$\left\{ \begin{array}{l} f^h(a_1) = a_{h+1} = -\frac{\sin(h-1)\theta}{\sin\theta} a_1 + \frac{\sin h\theta}{\sin\theta} a_2 \\ \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f^h(a_1) = (\alpha \text{Id} + \beta f)(a_1) = \alpha a_1 + \beta a_2 \\ \end{array} \right.$$

montrent que

$$f^h = \underbrace{-\frac{\sin(h-1)\theta}{\sin\theta} \text{Id}}_{\alpha_h} + \underbrace{\frac{\sin h\theta}{\sin\theta} f}_{\beta_h}$$

pour  $h \in \mathbb{N}^*$

\* Si  $h \in \mathbb{Z}^*$ , il existe  $q \in \mathbb{N}$  tel que  $h + nq = h' > 0$

(On peut, par ex., écrire la div. euclidienne de  $h$  par  $-n$ :  $h = -nq + h'$  avec  $0 \leq h' < n$ ), ce qui nous permet de nous ramener au cas où  $h' > 0$ :

$$f^{h'} = f^{nq+h} = f^n \Rightarrow f^h = \alpha_{f^n} \text{Id} + \beta_{f^n} f$$

(X)  $\Rightarrow$  (X) (par induction sur  $n$ )  $\Rightarrow$  (X)  $\Rightarrow$  (X)  $\Rightarrow$  (X)  $\Rightarrow$  (X)

\* Faisons  $\theta = \pi$  dans l'expression de  $f^h$ :

$$f^n = \text{Id} = -\frac{\sin(n-1)\theta}{\sin\theta} \text{Id} + \frac{\sin n\theta}{\sin\theta} f$$

$$\text{d'où } \begin{cases} \sin(n-1)\theta = -\sin\theta \\ \sin n\theta = 0 \end{cases}$$

(X)  $\Rightarrow$  (X)

Nécessairement:  $\sin(n\theta - \theta) = -\sin\theta$

$$\frac{\sin n\theta \cdot \cos\theta - \sin\theta \cdot \cos n\theta}{\sin\theta} = -\sin\theta$$

$\Rightarrow \sin n\theta \cdot \cos\theta = \sin\theta \cdot \cos n\theta$  (car  $\sin\theta \neq 0$ )

$$n\theta \equiv 0 \pmod{2\pi}$$

\* Faisons  $h = m$  où  $0 < m < n$ :

$$f^m = -\frac{\sin(m-1)\theta}{\sin\theta} \text{Id} + \frac{\sin m\theta}{\sin\theta} f$$

$\Rightarrow \sin m\theta \equiv 0 \pmod{2\pi}$ ,  $f^m$  serait égal à  $\text{Id}$ , ce qui est absurde d'après I.2.

Donc  $m\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$  dès que  $0 < m < n$ .

**II.1** Soit  $A_1, \dots, A_n$  un cycle pour  $g$ .

$$\begin{cases} A_1, A_2, \dots, A_n \text{ engendrent } \mathbb{E} \quad (\text{donc } n \geq 3) \\ g(A_i) = A_{i+1} \quad \forall i \in \mathbb{N}^* \\ A_i \text{ distinct de } A_j \quad \forall i \in [2, n] \end{cases}$$

$g$ , affine, transformant la partie  $\{A_1, \dots, A_n\}$  en elle-même, conservera

l'isobarycentre  $O$  de  $A_1, \dots, A_n$ .

La partie linéaire  $B$  de  $g$  vérifiera donc  $B(\vec{OA}_i) = \vec{OA}_{i+1}$ . Posons  $a_i = \vec{OA}_i$ .

On a  $\{a_1, \dots, a_n\}$  engendrant  $\mathbb{E}$  montre que  $B$  est cyclique d'ordre  $n \geq 3$ .

$$\begin{cases} B(a_i) = a_{i+1} \\ a_i \text{ distinct de } a_j \quad \forall i \in [2, n] \end{cases}$$

(\*) si  $a_1, \dots, a_n$  colinéaires  $\Rightarrow O, A_1, \dots, A_n$  alignés en contradiction avec "A" et "B" sont linéairement indépendants.

## II.2

\* Lemme: Si  $f$  est un endomorphisme cyclique d'ordre  $n \geq 3$ , alors  $f - Id$  est inversible.

Par l'absurde. Si  $f - Id$  n'était pas inversible, il serait valeur propre de  $f$  donc racine du polynôme caractéristique  $\chi_f(x)$  de  $f$ .

On a vu au I.4 que  $\chi_f(x)$ , qui n'est autre que le polynôme minimal  $m_f(x) = P(x)$  de  $f$ , n'a pas de racine double.

Etant de degré 2, admettant la racine réelle 1,  $P(x)$  admettra une 2-racine réelle qui ne peut être que  $-1$  (car  $P(x) \mid x^n - 1$  et  $x^n - 1$  a au plus 2 racines réelles  $\pm 1$ ).

$$\begin{aligned} \text{Donc } P(x) &= (x-1)(x+1) = x^2 - 1 \Rightarrow P(f) = f^2 - Id = 0 \\ &\Rightarrow f^2 = Id \text{ absurde car } n \geq 3 \quad (\text{II.1}) \end{aligned}$$

\*  $g$  admet un pt fixe unique: On a vu (II.1) que l'orbite centrale  $\mathcal{O}$  était invariant par  $g$ . Le seuil  $\mathcal{O}wg = \{M \mid g(M) = M\}$  passe par  $0$  et sa direction est  $\mathcal{O}wg = \text{Ker}(f - Id) = \{0\}$  (car  $f - Id$  inversible), donc  $\mathcal{O}wg = \{0\}$ .

\* Réciproquement, soit  $g \in GA(\mathbb{E})$  associée à l'end. cyclique  $f$  d'ordre  $n \geq 3$ .

On a vu que  $f - Id$  est inversible. On en déduit que  $g$  possède un unique point fixe  $0$ .

(En effet, si  $\underline{\omega} \in \mathbb{E}$  est fixe et  $\underline{\omega}' = g(\underline{\omega})$ ,

$$g(0) = 0 \Leftrightarrow \underline{\omega}'0 = f(\underline{\omega}0) \Leftrightarrow (f - Id)(\underline{\omega}0) = \underline{\omega}'\underline{\omega} \quad (*)$$

$f - Id$  étant inversible,  $\underline{\omega}'\underline{\omega}$  étant fixe, il existe 1 et 1 seul pt 0 vérifiant (\*).

Soit  $a_1, \dots, a_n$  un cycle pour  $f$

$A_1, \dots, A_n$  les points de  $\mathbb{E}$  définis par  $\overrightarrow{OA_i} = a_i$  (où  $g(0) = 0$ )

$$\left\{ \begin{array}{l} \overrightarrow{Og(A_i)} = f(\overrightarrow{OA_i}) = \overrightarrow{OA_{i+1}} \Rightarrow g(A_i) = A_{i+1} \quad \forall i \\ A_i \text{ distinct de } A_1 \\ A_1, \dots, A_n \text{ engendrent } \mathbb{E} \quad (\text{car } \overrightarrow{OA_1}, \dots, \overrightarrow{OA_n} \text{ engendrent } E) \end{array} \right. \quad (*)$$

ce  $g$  est cyclique.

$$\boxed{(*) \text{ ou encore: } \forall OEE \setminus \{A_1, \dots, A_n\} \quad A_1, \dots, A_n \text{ engendrent } \mathbb{E} \Leftrightarrow \overrightarrow{OA_1}, \dots, \overrightarrow{OA_n} \text{ eng. } E}$$

$\xrightarrow{\text{bij R } A_i, A_j, A_k \text{ base affiche}}$

$$\overrightarrow{OA_i}, \overrightarrow{OA_j}, \overrightarrow{OA_k} \text{ base de } E \Leftrightarrow \overrightarrow{OA_i}, \overrightarrow{OA_k} \text{ base de } E$$

$\xrightarrow{\exists i, j \text{ (cons. direct } \overrightarrow{OA_i})}$

[(\*) En effet, le o.e.a engendré par  $A_1, \dots, A_n$  contiendra l'orbite centrale  $\mathcal{O}$  de  $A_1, \dots, A_n$  (ie l'unique pt fixe de  $g$ ). Mais  $\overrightarrow{OA_1}, \dots, \overrightarrow{OA_n}$  engendrent  $E \Rightarrow \overrightarrow{O}, \overrightarrow{A_1}, \dots, \overrightarrow{A_n}$  engendrent  $\mathbb{E}$ . car trivial.]

**II.3**

\*  $A_1, A_2, A_3$  non alignés. Soient  $a_1 = \vec{A_1 A_2}$  et  $a_2 = \vec{A_2 A_3}$ .  $(a_1, a_2)$  est une base de  $E$ .  
 g cyclique d'ordre  $n$  vérifie  $g(A_1) = A_2$  et  $g(A_2) = A_3$  si et seulement si  $g$  vérifie  $g(A_1) = A_2$  et  
 si sa partie linéaire  $f$  est cyclique d'ordre  $n$  et telle que  $f(a_1) = a_2$ .  
 (cf II.1 et II.2)

Tout revient donc à construire un endomorphisme  $f$  cyclique d'ordre  $n$  tel  
 que  $f(a_1) = a_2$ .

\* Soit  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2\cos\theta \end{pmatrix}$  avec  $\begin{cases} n\theta \equiv 0 \pmod{2\pi} \\ k\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi} \text{ si } 0 < k < n \end{cases}$

Soit  $f$  l'endomorphisme de matrice  $A$  dans la base  $(a_1, a_2)$ .

On a vu (I.7) que :

$$f^k = -\frac{\sin((k-1)\theta)}{\sin\theta} \text{Id} + \frac{\sin k\theta}{\sin\theta} f \quad \text{si } k \in \mathbb{N}^*$$

D'où  $\begin{cases} f^k \neq \text{Id} \text{ si } 0 < k < n \\ f^n = \text{Id} \end{cases}$

$a_1, a_2, f(a_1), a_3, \dots, a_n$  ( $\text{ou } f(a_i) = a_{i+1} \text{ si } i \geq 1$ ) est un cycle pour  $f$  car :

$$1) \quad a_k \neq a_1 \text{ pour } k > 1.$$

Cela provient de I.7 :

$$a_k = -\frac{\sin((k-2)\theta)}{\sin\theta} \cdot a_1 + \frac{\sin(k\theta)}{\sin\theta} \cdot a_2$$

$$\text{d'où } a_k = a_1 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin((k-2)\theta) = -\sin\theta \\ \sin(k\theta) = 0 \end{cases} \Rightarrow \underbrace{\sin((k-1)\theta) \cos\theta}_{=0} - \sin\theta \cos((k-1)\theta) = -\sin\theta$$

$$\Rightarrow \cos((k-1)\theta) = 1 \Rightarrow (k-1)\theta \equiv 0 \pmod{2\pi} \text{ absurde.}$$

$$2) \quad a_1, a_2, \dots, a_n \text{ engendre } E \quad \text{car } (a_1, a_2) \text{ est une base de } E.$$

II.4

\*  $A_1, A_2, A_3, A_4$  4 pts de  $\mathbb{P}^2$ .

Si  $A_1, A_2, A_3$  alignés,  $f(\vec{A}_1 \vec{A}_2) = \vec{A}_2 \vec{A}_3$  montre que  $f$  admet 1 valeur propre réelle qui ne peut être que  $\pm 1$  ( $\det f^n = \pm 1$ ), ce qui est absurde (car  $f$  cyclique d'ordre  $n \geq 3$ , et on aurait  $f^2 = \text{Id}$ , cf preuve du lemme de II.2)

Supposons  $A_1, A_2, A_3$  non alignés. Posons  $a_1 = \vec{A}_1 \vec{A}_2$  et  $a_2 = \vec{A}_2 \vec{A}_3$ .  $(a_1, a_2)$  est une base.

Tout revient à trouver un endomorphisme cyclique  $f$  tel que

$$\begin{aligned} f(a_1) &= a_2 \\ f(a_2) &= \vec{A}_3 \vec{A}_4 \end{aligned} \quad \text{puis à poser } g(M) = A_2 + f(A_1 M)$$

\* Si l'endomorphisme  $f$  existe, sa matrice  $A$  dans la base  $(a_1, a_2)$

sera  $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2\cos\theta \end{pmatrix}$  (puisque  $f$  n'a pas de valeur propre réelle) d'après  $\det f^2 = \text{Id}$  impossible, cf lemme de II.2

la partie I,  $\theta$  vérifiant les conditions de I.7

Réiproquement, si  $\vec{A}_3 \vec{A}_4 = -a_1 + 2\cos\theta a_2$  avec  $\begin{cases} n\theta \equiv 0 \pmod{2\pi} \\ k\theta \not\equiv 0 \pmod{2\pi} \end{cases}$

alors  $f$  de matrice  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2\cos\theta \end{pmatrix}$  sera cyclique d'ordre  $n$  et

$a_1 = \vec{A}_1 \vec{A}_2, a_2 = \vec{A}_2 \vec{A}_3, a_3 = \vec{A}_3 \vec{A}_4, \dots, a_n$  ( $\text{car } f(a_i) = a_{i+1}$ ) sera

un cycle pour  $f$  (on prouve qu'en II.3)

Cf : La CNS cherchée est

$$\left\{ \begin{array}{l} A_1, A_2, A_3 \text{ alignés} \\ \text{et} \\ \vec{A}_3 \vec{A}_4 = -\vec{A}_1 \vec{A}_2 + 2 \cos\theta \vec{A}_2 \vec{A}_3 \end{array} \right.$$

**III.1** Soit  $a_1, \dots, a_n$  un cycle pour  $f$

$$\begin{cases} a_1, \dots, a_n \text{ engendrent } E \\ f(a_i) = a_{i+1} \\ a_i \neq a_1 \quad \forall i \in [2, n] \end{cases}$$

\*  $\forall h \in \mathbb{N} \quad \forall i \in \mathbb{N}_n \quad f^h(a_i) = a_{i+h}$ , donc  $f^n(a_i) = a_{i+n} = a_i$

Comme  $a_1, \dots, a_n$  engendre  $E$ , cela prouve bien que  $f^n = \text{Id}$ .

\* Montons que  $(a_i, a_{i+1}, a_{i+2})$  est libre ( $\forall i \in \mathbb{N}_n$ )

**E. II**

Si  $\alpha a_i + \beta a_{i+1} + \gamma a_{i+2} = 0$ , en appliquant  $f^{n-i+1}$  on se ramène à :

$$\alpha a_1 + \beta a_2 + \gamma a_3 = 0$$

Si  $\gamma \neq 0$ ,  $a_3 = f^2(a_1)$  s'exprime en fonction de  $a_1, a_2$  et on vérifie par récurrence sur  $i$  que tout vecteur  $a_i$  ( $i \geq 3$ ) appartient à  $\text{Vect}(a_1, a_2)$ :

$$\begin{aligned} \text{au rang } i \quad a_i &= f(a_{i-1}) = f(\lambda a_1 + \mu a_2) = \lambda f(a_1) + \mu f(a_2) \\ &= \lambda a_2 + \mu a_3 \in \text{Vect}(a_1, a_2) \end{aligned}$$

Donc  $\text{Vect}(a_1, \dots, a_n) = \text{Vect}(a_1, a_2)$  ce qui est contraire à l'hypothèse : "  $a_1, \dots, a_n$  engendrent  $E$  de dimension 3".

Finalement  $\gamma = 0$ . On recommence le même raisonnement avec  $\beta$  pour conclure  $\alpha = \beta = \gamma = 0$ .

\*  $\text{Id}, f, f^2$  sera un système libre car :

$$\alpha \text{Id} + \beta f + \gamma f^2 = 0 \Rightarrow \alpha a_1 + \beta a_2 + \gamma a_3 = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0$$

le système  $a_1, a_2, a_3$  étant libre.

**III.2** La matrice de  $f$  dans la base  $(a_1, a_2, a_3)$  est  $M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & c \end{pmatrix}$

Le polynôme caractéristique de  $f$  est :

$$\chi_f(X) = \begin{vmatrix} -X & 0 & a \\ 1 & -X & b \\ 0 & 1 & c-X \end{vmatrix} = -X^3 + cX^2 + bX + a$$

Etant indépendant de la base choisie pour le calculer, les coefficients  $a, b, c$  ne dépendront que de  $f$ .

NB:  $c = \text{tr } f$  et  $\det f = a$ . De  $\text{Id}^n = f$  on déduit  $\det f = \pm 1$   
d'où  $a = \pm 1$ .

\* Le Th. de Cayley-Hamilton entraîne  $X_f(f) = 0$  soit  $f^3 - cf^2 - bf - a \text{Id} = 0$ .

**III.3**  $I(f) = (m)$  où  $m$  est le polynôme minimal de  $f$ .

$m | X_f$  donc  $\deg m \leq 3$

$$\deg m = 1 \Rightarrow m(x) = x - \lambda \Rightarrow f = \lambda \text{ Id} \text{ absurde.}$$

$$\deg m = 2 \Rightarrow m(x) = x^2 + \lambda x + \mu \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R} \text{ donc } m(f) = f^2 + \lambda f + \mu \text{ Id} = 0$$

ce qui est absurde car  $\text{Id}, f, f^2$  est libre (III.1)

Donc  $\deg m = 3$ , et  $m | X_f$  entraîne  $m = -X_f$ .

$X_f$  divise donc  $x^m - 1$ .  $X_f$  étant un polynôme à coefficients réels, si  $\lambda$  est une racine complexe non réelle de  $X_f$ ,  $\bar{\lambda}$  sera aussi racine de  $f$ .

Comme  $X_f$  est de degré 3, on en déduit que  $X_f$  possède au moins une racine réelle  $\pm 1$  (puisque racine  $m$ -ième de l'unité).  $X_f | x^m - 1$  et tous les racines de  $x^m - 1$  sont simples : toutes les racines de  $X_f$  seront donc simples.

Puisque,  $f$  possède 3 valeurs propres distinctes : une réelle ( $+1$  ou  $-1$ ) et 2 racines complexes conjuguées  $e^{\pm i\theta}$  où  $\theta = \frac{k\pi}{m}$   $0 < k < m$ .

**III.4** On a vu que  $\text{Id}^n = f \Rightarrow \det f = \pm 1$ .

$$f \text{ direct} \Leftrightarrow \det f = 1 = \begin{vmatrix} \lambda & & 0 \\ e^{i\theta} & e^{-i\theta} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\theta} \end{vmatrix} = \lambda \Rightarrow \boxed{\lambda = 1}$$

$$f \text{ indirecte} \Leftrightarrow \det f = -1 \Rightarrow \boxed{\lambda = -1}$$

\* Si  $f$  est directe :  $a = 1$

$\lambda = 1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}$  sont les racines de  $X_f(x) = x^3 - cx^2 - bx - 1 = 0$

$$\text{donc } 1 + e^{i\theta} + e^{-i\theta} = c \Rightarrow \boxed{c = 1 + 2 \cos \theta}$$

$$1 \cdot e^{i\theta} + e^{i\theta} \cdot e^{-i\theta} + e^{-i\theta} \cdot 1 = -b \Rightarrow \boxed{b = -(1 + 2 \cos \theta)}$$

\* Si  $f$  est indirecte :  $a = -1$  et  $\lambda = -1$  car  $(\alpha_1, \beta_1, \gamma_1)$  sont distincts

$\lambda = -1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}$  sont les racines de  $X^3 - cX^2 - bX + 1$

donc  $\begin{cases} c = -1 + e^{i\theta} + e^{-i\theta} = -1 + 2 \cos \theta \\ b = -(-1 \cdot e^{i\theta} + e^{i\theta} \cdot e^{-i\theta} + e^{-i\theta} \cdot (-1)) = 1 - 2 \cos \theta \end{cases}$

La condition sur  $n$  est obtenue en notant que  $f^n = \text{Id}$ , donc  $(\det f)^n = 1$  et  $\det f = a = -1$ , donc  $(-1)^n = 1$ .

Ainsi  $f$  est indirecte si et seulement si  $n$  pair.

**III.5** Soit  $f$  directe :  $a = 1$  et les valeurs propres de  $f$  sont  $1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}$  avec  $\theta = k \frac{2\pi}{n}$   $0 < k < n$ .

\* Il y a au plus un seul plan stable par  $f$ :

Si  $F$  est un plan stable par  $f$ , le polynôme caractéristique  $f|_F$  divisera celui de  $f$  (il suffit d'écrire la matrice de  $f$  dans une base  $(e_1, e_2, e_3)$  où  $(e_2, e_3)$  est une base de  $F$ ). On obtient  $M = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & A \end{pmatrix}$  où  $A = \text{Mat}(f|_F; e_2, e_3)$ , donc  $\chi_f(x) = \det(M - xI) = (a-x) \cdot \det(A - xI) \Leftrightarrow \chi_{f|_F} | \chi_f$

Les valeurs propres de  $f|_F$  seront distinctes et à choisir dans  $\{1, e^{i\theta}, e^{-i\theta}\}$ .

$\chi_{f|_F} \in \mathbb{R}[x]$  montre que ces valeurs propres seront  $e^{i\theta}$  et  $e^{-i\theta}$ , i.e non réelles.

Si  $F$  et  $G$  sont 2 plans stables par  $f$ , la droite  $F \cap G$  sera stable par  $f$  donc  $f|_F$  admettra une valeur propre réelle ; c'est alors d'après ce qui précède.

\* Le seuil  $F = \text{Vect}(a_2 - a_1, \dots, a_n - a_1, \alpha_1 - \alpha_n)$  est stable par  $f$  car :

$$\forall i, f(a_{i+1} - a_i) = f(a_{i+1}) - f(a_i) = a_{i+2} - a_{i+1}$$

$(a_2 - a_1, a_3 - a_2)$  est libre car  $\lambda(a_2 - a_1) + \mu(a_3 - a_2) = 0 \Rightarrow -\lambda a_1 + (\lambda - \mu) a_2 + \mu a_3 = 0 \Rightarrow \lambda = \mu = 0$  car  $(a_1, a_2, a_3)$  étant une base.

Ex Montons que  $(a_2-a_1, a_3-a_2)$  engendre  $F$ .

Par récurrence sur  $i$ , montons :  $a_{i+1}-a_i \in \text{Vect}(a_2-a_1, a_3-a_2)$

$$\forall i \in [1, n] \quad a_{i+1}-a_i \in \text{Vect}(a_2-a_1, a_3-a_2)$$

C'est trivial si  $i=1$  ou  $2$ . Supposons la propriété vraie jusqu'au rang  $i-1$  (avec  $i-1 < n$ ). On a :

$$\begin{aligned} a_{i+1}-a_i &= f(a_i-a_{i-1}) = f(\alpha(a_2-a_1)+\beta(a_3-a_2)) \\ &= \alpha(a_3-a_2)+\beta(a_4-a_3) \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

et tout revient à prouver que  $a_4-a_3 \in \text{Vect}(a_2-a_1, a_3-a_2)$ .

$$a_4=f^3(a_1)=(cf^2+b f+a)(a_1)=ca_3+ba_2+aa_1$$

$$\text{Donc } a_4-a_3=(c-1)a_3+ba_2+aa_1 \text{ s'écrit } \alpha(a_2-a_1)+\beta(a_3-a_2)$$

$$\text{ssi } \begin{cases} \alpha=-a \\ \alpha-\beta=b \\ \beta=c-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha=-a \\ \beta=c-1=-a-b \\ \beta=c-1 \end{cases}$$

C'est possible si  $c-1=-a-b$ , ce qui est le cas puisque III.4 montre

$$\begin{cases} a=1 \\ b=-(1+2\cos\theta) \\ c=1+2\cos\theta \end{cases}$$

CQFD

\*  $(a_2-a_1, \dots, a_n-a_{n-1})$  est un cycle pour  $f|_F$  : Il reste seulement à prouver que  $a_{i+1}-a_i$  est toujours distinct de  $a_2-a_1$ .

Supposons, par l'absurde, que  $a_{j+1}-a_j=a_2-a_1$ . Alors  $f^{j-1}(a_2-a_1)=a_2-a_1$  entraînerait  $f^{j-1}(a_3-a_2)=f^{j-1}(f(a_2-a_1))=f(a_2-a_1)=a_3-a_2$  donc  $f|_F^{j-1}=\text{Id}_F$ . Les valeurs propres de  $f|_F$  sont  $e^{\pm i\theta}$  où  $\theta=\frac{2\pi}{n}k$  avec  $0 \leq k < n$ . Elles vérifieront donc  $(e^{\pm i\theta})^{j-1}=1$  où  $0 \leq j-1 < n$ .

Si  $0 < j < n$ ,  $f^j \neq \text{Id}$  (sinon  $f^j(a_1)=a_{j+1}=a_1$  absurde) donc  $(e^{\pm i\theta})^{j-1} \neq 1$  ce qui est absurde.

**III.6**

III.5 montre que  $f|_F$  est cyclique d'ordre  $n$ . La partie I affirme l'existence d'un produit scalaire  $\overline{\Xi}_F$  sur  $F$  tel que  $\overline{\Xi}_F(a_2-a_1, a_2-a_1) = 1$  et  $\overline{\Xi}_F(f(x), f(y)) = \overline{\Xi}_F(x, y) \quad \forall x, y \in F.$

Le vecteur propre  $\text{Re}_{e_1}$  associé à la valeur propre 1 de  $f$  n'est pas inclus dans le plan  $F$ . Donc  $E = F \oplus \text{Re}_{e_1}$ .

Définissons la forme bilinéaire symétrique  $\overline{\Xi}$  par :

$$\begin{cases} \overline{\Xi}(e_1, e_1) = 1 \\ \overline{\Xi}(x, y) = 0 \quad \forall x \in F \quad \forall y \in \text{Re}_{e_1} \\ \overline{\Xi}(x, y) = \overline{\Xi}_F(x, y) \quad \forall x, y \in F \end{cases}$$

On a :  $\forall z \in E \quad z = x + \lambda e_1 \quad x \in F \quad \lambda \in \mathbb{R}$

$$\text{et } \overline{\Xi}(z, z') = \overline{\Xi}(x + \lambda e_1, x' + \lambda' e_1) = \overline{\Xi}(x, x') + \lambda \lambda'$$

Clairement :

$$\begin{cases} \overline{\Xi}(z, z) = \overline{\Xi}_F(x, x) + \lambda^2 \geq 0 \\ \overline{\Xi}(z, z) = 0 \Rightarrow z = 0 \\ \overline{\Xi}(f(z), f(z')) = \overline{\Xi}(z, z') \quad \text{pour tout } z, z' \in E \end{cases}$$

$\overline{\Xi}$  sera un produit scalaire rendant  $f$   $\overline{\Xi}$ -orthogonale.

**III.7** a) Soit  $A_1, \dots, A_n$  un cycle pour  $f$ . L'isobarycentre  $O$  de  $A_1, \dots, A_n$  sera invariant par  $f$ . Si  $a_i = \vec{OA}_i$ , on aura :

$$f(a_i) = a_{i+1}$$

$$a_i \neq a_1 \quad i \in [2, n]$$

$a_1, \dots, a_n$  engendrent  $E$  (car  $\vec{A}_1 A_2, \dots, \vec{A}_n A_1$  engendrent  $E$  par hypothèse) et  $\forall x \in E \quad \exists \alpha_i \quad x = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{A}_1 A_i = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{OA}_i - \left( \sum_{i=1}^n \alpha_i \right) \vec{OA}_1$

b) On a vu que  $g(0) = 0$ . Si  $0'$  était un autre pt invariant par  $g$ , on aurait  $\overrightarrow{f(0')} = \overrightarrow{0'} \Leftrightarrow 0' \in \text{Ker}(f - \text{Id})$ .  
Montrons que  $\text{Ker}(f - \text{Id}) = \{0\}$ .

Supposons, par l'absurde, qu'il existe  $x \neq 0$  tel que  $f(x) = x$ , i.e que  $f$  admet la valeur propre 1, i.e que  $f$  est directe.  
Alors  $f$  est une application  $\mathbb{E}$ -orthogonale pour le produit scalaire  $\mathbb{E}$  introduit au III.6. C'est donc une rotation d'axe  $\mathbb{R}x$ . Cela contredit que  $g$  soit cyclique car si  $A_1 \in E$  est donné, les points  $A_1, A_2 = g(A_1), \dots, A_n = g^{n-1}(A_1)$  seront coplanaires et ne pourront en aucun cas engendrer l'espace affine  $\mathbb{E}$ .

$$\begin{aligned} & \forall x \in \mathbb{R} + (\alpha, \beta) \mathbb{E} = (\alpha^2 x + \alpha, \beta x + \beta) \mathbb{E} = (1, g) \mathbb{E} \\ & \quad \left. \begin{aligned} & \alpha \in \mathbb{R} + (\alpha, \beta) \mathbb{E} = (1, g) \mathbb{E} \\ & \alpha = g \quad \alpha \in (1, g) \mathbb{E} \end{aligned} \right\} : \text{d'après le lemme} \\ & \text{et donc } (1, g) \mathbb{E} = ((1, g) \mathbb{E}) \mathbb{E} = (1, g)^2 \mathbb{E} = (1, g)(1, g) \mathbb{E} \end{aligned}$$

$\forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R} + (\alpha, \beta) \mathbb{E} = ((1, g)^n) \mathbb{E} = (1, g^n) \mathbb{E}$

Notons que  $(1, g^n) \mathbb{E}$  est l'ensemble des points  $(1, g^n)x + (0, 0)$  pour tout  $x \in \mathbb{R}$ .

$$(1, g^n)(x, y) = (1, g^n)x + (0, 0) = (1, g^n)x$$