

Agrégation interne
de Mathématiques
session 2012

première composition

Énoncé

Visitez le site Megamaths : <http://megamaths.perso.neuf.fr/>

– Introduction et notations –

On désigne par E un espace vectoriel euclidien de dimension $n \geq 1$. Si x et y sont deux vecteurs de E , on note $x.y$ leur produit scalaire et $\|x\| = \sqrt{x.x}$ la norme associée.

Un réseau Λ de E est une partie de E vérifiant la propriété suivante : *il existe une base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ de E telle que Λ soit l'ensemble des combinaisons linéaires à coefficients entiers des éléments de \mathcal{B} :*

$$\Lambda = \left\{ x \in E / \exists (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}^n \quad x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \right\}.$$

On dit alors que Λ est le réseau défini par la base \mathcal{B} , et que \mathcal{B} est une \mathbb{Z} -base de Λ .

Soit $u : E \rightarrow F$ une application linéaire, F étant un espace euclidien dont on note $\langle x, y \rangle$ le produit scalaire. On dit que u est une isométrie si, pour tous $x, y \in E$, on a $x.y = \langle u(x), u(y) \rangle$, et que u est une similitude s'il existe une isométrie $v : E \rightarrow F$ et un nombre réel $\lambda > 0$ tel que $u = \lambda v$.

Si Λ est un réseau de E et Λ' un réseau de F , on dit que Λ et Λ' sont semblables s'il existe une similitude $u : E \rightarrow F$ telle que $u(\Lambda) = \Lambda'$.

On désigne par $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$ l'ensemble des matrices M d'ordre n à coefficients dans \mathbb{Z} , inversibles dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et dont l'inverse M^{-1} est également à coefficients dans \mathbb{Z} .

On rappelle enfin la formule suivante : si Ω , \mathcal{B} , \mathcal{B}' sont trois bases de E , alors :

$$\det_{\Omega} \mathcal{B}' = \det_{\Omega} \mathcal{B} \cdot \det_{\mathcal{B}} \mathcal{B}'.$$

– Partie A –

On considère dans cette partie un réseau Λ de E , et (e_1, \dots, e_n) une \mathbb{Z} -base de Λ .

1. (a) Soit $M \in \text{GL}_n(\mathbb{Z})$; montrer que $\det M = \pm 1$.

(b) Soit M une matrice à coefficients dans \mathbb{Z} telle que $\det M = \pm 1$. Montrer que M appartient à $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$ (on pourra considérer la transposée de la comatrice de M).

(c) Montrer que l'ensemble $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$ est un sous-groupe du groupe multiplicatif $(\text{GL}_n(\mathbb{R}), \times)$.

2. Vérifier que Λ est un sous-groupe de $(E, +)$.

3. Montrer que deux bases \mathcal{B} et \mathcal{B}' de E définissent le même réseau Λ si et seulement si la matrice de passage P de \mathcal{B} à \mathcal{B}' appartient à $\text{GL}_n(\mathbb{Z})$.

4. On suppose dans cette question que $n = 2$ et on note \mathbb{Z}^2 le réseau dont une \mathbb{Z} -base est la base canonique $(\varepsilon_1, \varepsilon_2)$ de \mathbb{R}^2 . Soit $x = a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2$ un vecteur de \mathbb{Z}^2 avec a et b deux entiers premiers entre eux.

(a) Montrer qu'il existe un vecteur y de \mathbb{Z}^2 tel que (x, y) est une \mathbb{Z} -base du réseau \mathbb{Z}^2 .

(b) Construire une telle base lorsque $x = 101\varepsilon_1 + 49\varepsilon_2$.

(c) Dans le cas général où $x = a\varepsilon_1 + b\varepsilon_2$ avec a et b deux entiers premiers entre eux, écrire un algorithme permettant de trouver les coordonnées d'un vecteur y tel que (x, y) est une \mathbb{Z} -base de \mathbb{Z}^2 .

(d) Soit $\Lambda = \{x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 / (x_1, x_2) \in \mathbb{Z}^2 \quad x_2 \equiv x_1 \pmod{3}\}$. Montrer que Λ est un réseau de \mathbb{R}^2 (on en exhibera une \mathbb{Z} -base).

5. Soit \mathcal{B} une \mathbb{Z} -base de Λ et Ω une base orthonormale de E . Montrer que $|\det_{\Omega} \mathcal{B}|$ ne dépend ni de la \mathbb{Z} -base \mathcal{B} de Λ ni de la base orthonormale Ω de E . Ce nombre ne dépendant donc que du réseau Λ , on le note $\det \Lambda$.

6. (a) Montrer qu'il existe un nombre réel $A > 0$ tel que, pour tout vecteur $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$ de E , on a :

$$A \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| \leq \|x\|.$$

(b) En déduire que toute boule $\{x / \|x\| < R\}$ centrée en l'origine et de rayon $R > 0$ ne contient qu'un nombre fini de vecteurs de Λ .

(c) En déduire que $m(\Lambda) = \inf_{x \in \Lambda, x \neq 0} \|x\|$ est un réel strictement positif et qu'il existe un vecteur $x_0 \in \Lambda$ tel que $m(\Lambda) = \|x_0\|$.

(d) On désigne par $S(\Lambda)$ l'ensemble $\{x \in \Lambda / \|x\| = m(\Lambda)\}$. Montrer que $S(\Lambda)$ est fini, puis que $\text{Card } S(\Lambda)$ est un entier pair et non nul.

7. On suppose que u_1, \dots, u_k sont k vecteurs de Λ tels que, pour tout $x \in \Lambda$, il existe $(x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{Z}^k$ unique tels que $x = \sum_{i=1}^k x_i u_i$. Montrer que $k = n$ et que (u_1, \dots, u_k) est une base de E (on pourra considérer le \mathbb{Q} -espace vectoriel engendré par (e_1, \dots, e_n)).

8. Soit $D_1 = \mathbb{R}e_1$ la droite engendrée par e_1 . Montrer que $D_1 \cap \Lambda = \mathbb{Z}e_1$. On suppose que $n \geq 2$. Soit F un supplémentaire de D_1 dans E , et p la projection de E sur F parallèlement à D_1 . Montrer que $\Lambda' = p(\Lambda)$ est un réseau de F , de \mathbb{Z} -base $(p(e_2), \dots, p(e_n))$. Soit réciproquement (u'_2, \dots, u'_n) une \mathbb{Z} -base de Λ' , et (u_2, \dots, u_n) des éléments de Λ tels que $p(u_2) = u'_2, \dots, p(u_n) = u'_n$. Montrer que (e_1, u_2, \dots, u_n) est une \mathbb{Z} -base de Λ .

9. On note $\varphi_1 : E \rightarrow \mathbb{R}$ la forme linéaire qui à tout vecteur $x_1 e_1 + \dots + x_n e_n$ de E associe x_1 et on pose $F_1 = \text{Ker } \varphi_1$. Soit G un sous-groupe de Λ distinct de $\{0\}$.

(a) Montrer qu'il existe $a_1 \in \mathbb{Z}$ tel que $\varphi_1(G) = a_1 \mathbb{Z}$.

(b) En déduire que, si $n = 1$, G est un réseau de E .

(c) On suppose $n \geq 2$, et on note Λ_1 le réseau de F_1 de \mathbb{Z} -base (e_2, \dots, e_n) . On considère $H = G \cap F_1$. Montrer que H est un sous-groupe de Λ_1 .

(d) On suppose $a_1 \neq 0$; soit $b \in G$ tel que $\varphi_1(b) = a_1$. Montrer que, pour tout x de G , il existe un unique couple $(m, v) \in \mathbb{Z} \times H$ tel que $x = mb + v$.

(e) En déduire qu'il existe un sous-espace vectoriel F de E tel que G est un réseau de F (on pourra raisonner par récurrence sur n , en distinguant les cas $G \subset F_1$ et $G \not\subset F_1$).

10. Soit $b = r_1 e_1 + \dots + r_n e_n$ un élément de $S(\Lambda)$.

(a) Soit k un entier ≥ 2 . Montrer que $\frac{1}{k}b$ n'est pas un élément de Λ .

(b) En déduire qu'il existe $s_1, \dots, s_n \in \mathbb{Z}$ tels que $r_1 s_1 + \dots + r_n s_n = 1$.

(c) Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ la forme linéaire sur E définie par :

$$f(x_1 e_1 + \dots + x_n e_n) = s_1 x_1 + \dots + s_n x_n.$$

Montrer que $f(\Lambda) = \mathbb{Z}$, que $H = \Lambda \cap \text{Ker } f$ est un sous-groupe de Λ et que tout élément de Λ s'écrit de façon unique sous la forme $ab + u$, avec $u \in H$ et $a \in \mathbb{Z}$.

(d) Montrer qu'il existe une \mathbb{Z} -base de Λ contenant le vecteur b .

(e) On suppose $n \geq 2$. Soit F l'orthogonal de la droite $\mathbb{R}b$ engendrée par b , et p la projection orthogonale de E sur F . Montrer que $p(\Lambda)$ est un réseau de F .

– **Partie B : Réseaux et matrices de Gram** –

Soit $\mathcal{E} = (e_1, \dots, e_n)$ un système de n vecteurs de E . On appelle matrice de Gram associée à \mathcal{E} la matrice définie par les produits scalaires :

$$G = (e_i \cdot e_j)_{i,j} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Soit une base orthonormale $\Omega = (\omega_1, \dots, \omega_n)$ de E et $M = (m_{ij})$ la matrice de \mathcal{E} sur Ω (les colonnes de M contiennent les composantes des vecteurs e_j dans la base Ω).

1. Montrer que $G = {}^t M M$. En déduire que \mathcal{E} est une base de E si et seulement si $\det G \neq 0$.
2. Soit un réseau Λ de E , muni d'une \mathbb{Z} -base \mathcal{E} de matrice de Gram G . Montrer que :

$$\det G = (\det \Lambda)^2.$$

3. Soit $\mathcal{B} = (b_1, \dots, b_n)$ une famille de n vecteurs d'un réseau Λ . Montrer que \mathcal{B} est une \mathbb{Z} -base de Λ si et seulement si $|\det_{\Omega} \mathcal{B}| = \det \Lambda$.

4. Soient Λ un réseau de E , F un espace euclidien, et Λ' un réseau de F .

(a) Montrer qu'il existe une isométrie $u : E \rightarrow F$ telle que $\Lambda' = u(\Lambda)$ si et seulement s'il existe une \mathbb{Z} -base \mathcal{B} de Λ et une \mathbb{Z} -base \mathcal{B}' de Λ' telles que les deux matrices de Gram G et G' associées à ces deux bases soient égales,

(b) Montrer que les deux propriétés suivantes sont équivalentes :

- i. Λ et Λ' sont semblables.
- ii. il existe une \mathbb{Z} -base \mathcal{B} de Λ , une \mathbb{Z} -base \mathcal{B}' de Λ' et un réel μ strictement positif tels que si G et G' sont les deux matrices de Gram associées à \mathcal{B} et \mathcal{B}' alors on a $G' = \mu G$.

(c) Pour tout réseau Λ on pose :

$$\Gamma_n(\Lambda) = m(\Lambda)^2 (\det \Lambda)^{-\frac{2}{n}}.$$

Si les réseaux Λ et Λ' sont semblables, démontrer que $\Gamma_n(\Lambda) = \Gamma_n(\Lambda')$ et $\text{Card } S(\Lambda) = \text{Card } S(\Lambda')$.

– **Partie C : Quelques exemples de réseaux** –

On note, dans cette partie, $\mathcal{E}_n = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)$ la base canonique de \mathbb{R}^n , que l'on munit de sa structure euclidienne usuelle.

1. **Le réseau \mathbb{Z}^n .** On désigne par \mathbb{Z}^n le réseau dont une \mathbb{Z} -base est \mathcal{E}_n . Calculer $\det \mathbb{Z}^n$, $m(\mathbb{Z}^n)$, $S(\mathbb{Z}^n)$ et $\text{Card } S(\mathbb{Z}^n)$.

2. **Le réseau D_n .** On suppose que $n \geq 2$, et on désigne par D_n la partie de \mathbb{Z}^n définie par :

$$D_n = \{x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{Z}^n / x_1 + \dots + x_n \equiv 0 \pmod{2}\}.$$

- (a) Montrer que D_n est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}^n, +)$.
- (b) On pose $e_1 = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$ et $e_j = \varepsilon_j - \varepsilon_{j-1}$ pour $j \in \{2, \dots, n\}$. Montrer que D_n est un réseau de \mathbb{R}^n admettant $\mathcal{B} = (e_i)_{1 \leq i \leq n}$ comme \mathbb{Z} -base.
- (c) Calculer $m(D_n)$, $S(D_n)$ et $\text{Card } S(D_n)$.
- (d) Calculer $\det D_n$.
- (e) Calculer la matrice de Gram associée à \mathcal{B} .
- (f) Montrer que D_2 est semblable à \mathbb{Z}^2 . Donner une similitude f telle que $f(\mathbb{Z}^2) = D_2$.
- (g) Montrer que, pour $n \geq 3$, D_n n'est pas semblable à \mathbb{Z}^n .

3. Le réseau A_2 .

Soit H le plan de \mathbb{R}^3 d'équation $x_1 + x_2 + x_3 = 0$. On définit $A_2 = H \cap \mathbb{Z}^3$.

(a) Montrer que $\mathcal{B} = (\varepsilon_2 - \varepsilon_1, \varepsilon_2 - \varepsilon_3)$ est une \mathbb{Z} -base de A_2 , qui est donc un réseau de H .

(b) Calculer la matrice de Gram associée à \mathcal{B} .

(c) Calculer $m(A_2)$, $S(A_2)$ et $\text{Card } A_2$.

(d) i. Montrer que A_2 n'est pas semblable à D_2 .

ii. Montrer que le réseau A_2 est semblable au réseau de \mathbb{R}^2 défini par $\Lambda = \mathbb{Z}u_1 + \mathbb{Z}u_2$ où $u_1 = (1, 0)$ et $u_2 = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$ (on pourra utiliser la question (4.b) de la partie précédente).

iii. Justifier par un dessin l'appellation « réseau hexagonal » parfois donnée à Λ .

– Partie D –

1. On suppose dans cette question que $n \geq 2$. Soit Λ un réseau de E et b_1 un élément de $S(\Lambda)$. D'après la dernière question de la partie A, il existe une \mathbb{Z} -base (b_1, u_2, \dots, u_n) de Λ contenant b_1 , et, si p est la projection orthogonale de E sur $(\mathbb{R}b_1)^\perp$, $\Lambda' = p(\Lambda)$ est un réseau de $(\mathbb{R}b_1)^\perp$ dont $(p(u_2), \dots, p(u_n))$ est une \mathbb{Z} -base d'après la question (A.8).

(a) Montrer que $\det \Lambda = \|b_1\| \det \Lambda'$.

(b) Soit un vecteur $x' \in \Lambda'$, et $x_0 \in \Lambda$ tel que $p(x_0) = x'$. On écrit $x_0 = \alpha b_1 + x'$, α étant un nombre réel. Montrer qu'il existe un entier m tel que :

$$(m - \alpha)^2 \leq \frac{1}{4}.$$

On pose $x = x_0 - mb_1$. Montrer que $x \in \Lambda$, que $p(x) = x'$, puis, en utilisant la propriété que b_1 est de norme minimum, que :

$$\|x\|^2 \leq \frac{4}{3} \|x'\|^2.$$

2. Soit Λ un réseau de E .

(a) Montrer qu'il existe une \mathbb{Z} -base (u_2, \dots, u_n) de Λ telle que :

$$\prod_{i=1}^n \|u_i\|^2 \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{n(n-1)}{2}} (\det \Lambda)^2 \quad (1)$$

(on pourra raisonner par récurrence sur n).

(b) En déduire l'inégalité :

$$m(\Lambda)^2 \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{n-1}{2}} (\det \Lambda)^{\frac{2}{n}}. \quad (2)$$

Par l'inégalité (2) on a $\Gamma_n(\Lambda) \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{n-1}{2}}$. La borne supérieure des nombres $\Gamma_n(\Lambda)$, Λ parcourant l'ensemble des réseaux de E , est donc définie. On la note γ_n . D'après ce qui précède $\gamma_n \leq \left(\frac{4}{3}\right)^{\frac{n-1}{2}}$.

3. (a) Montrer que $\gamma_2 = 2/\sqrt{3}$ (on pourra considérer le réseau A_2).

(b) Réciproquement, soit un réseau Λ d'un espace vectoriel euclidien E de dimension 2, tel que $\Gamma_2(\Lambda) = 2/\sqrt{3}$. On se propose de montrer que Λ est semblable au réseau A_2 .

i. Justifier le fait qu'on peut se ramener au cas où $m(\Lambda) = 1$, ce que l'on suppose désormais.

ii. Soit (u_1, u_2) une \mathbb{Z} -base de Λ vérifiant l'inégalité (1). Montrer que $\|u_1\| = \|u_2\| = 1$ et que le déterminant de (u_1, u_2) dans une base orthonormale de E est égal à $\pm\sqrt{3}/2$.

iii. Conclure.

– Partie E –

Dans ce qui suit, E désigne un plan euclidien et (e_1, e_2) une base orthonormale de E . Soit p un nombre premier, K le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et m un diviseur de $p - 1$. On note $f_m : K^* \rightarrow K^*$ le morphisme de groupes multiplicatifs défini par $f_m(x) = x^m$.

1. (a) Montrer que, pour tout élément $y \in f_m(K^*)$, $y^{(p-1)/m} - 1 = 0$.

(b) En déduire que :

$$\text{Card } f_m(K^*) \leq \frac{p-1}{m},$$

puis que $\text{Card}(\text{Ker } f_m) \geq m$.

(c) En déduire que le polynôme $X^m - 1$ est scindé dans $K[X]$.

2. On suppose que $m = 4$.

(a) Déduire de la question précédente qu'il existe un entier relatif u tel que $u^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$.

(b) Soit Λ le réseau de E de \mathbb{Z} -base $(pe_1, ue_1 + e_2)$. Montrer que, pour tout $x \in \Lambda$, $\|x\|^2$ est un entier divisible par p .

(c) Montrer qu'il existe un vecteur non nul de Λ dont le carré de la norme vaut p (on pourra utiliser l'inégalité (2)).

(d) En déduire que, pour tout nombre premier $p \equiv 1 \pmod{4}$, il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $p = a^2 + b^2$.

3. On suppose que $m = 8$.

(a) Montrer que le polynôme $X^4 + 1$ est scindé dans $K[X]$. En déduire qu'il existe $u \in \mathbb{Z}$ tel que $u^2 + 2 \equiv 0 \pmod{p}$ (si z est une racine de $X^4 + 1$, on pourra calculer $(z - \frac{1}{z})^2$).

(b) En déduire que, pour tout nombre premier $p \equiv 1 \pmod{8}$, il existe a, b dans \mathbb{Z} tels que $p = a^2 + 2b^2$ (on considérera le réseau de E de \mathbb{Z} -base $(pe_1, ue_1 + \sqrt{2}e_2)$).

4. On suppose que $m = 3$.

(a) Montrer que $X^2 + X + 1$ est scindé dans $K[X]$. En déduire qu'il existe $u \in \mathbb{Z}$ tel que $u^2 + 3 \equiv 0 \pmod{p}$.

(b) Soit Λ le réseau de E de \mathbb{Z} -base $(pe_1, ue_1 + \sqrt{3}e_2)$. Montrer que, pour tout $x \in \Lambda$, $\|x\|^2$ est un entier divisible par p , et que $\|x\|^2$ est soit impair, soit divisible par 4.

(c) En déduire que, pour tout nombre premier $p \equiv 1 \pmod{3}$, il existe $a, b \in \mathbb{Z}$ tels que $p = a^2 + 3b^2$.